

University of Groningen

Het chronische subdurale haematoom bij de volwassene

Eringa, Popken Sjoerd

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1978

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Eringa, P. S. (1978). *Het chronische subdurale haematoom bij de volwassene*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN

I

Mogelijk verdient het aanbeveling de uitdrukking „chronisch subduraal haematoom” te vervangen door „chronische subdurale vochtophoping”.

II

Bij het denken over de pathogenese van subdurale vochtophopingen wordt menigmaal te weinig rekening gehouden met een eventuele beïnvloeding van het capillairenet van het binnenblad van de dura door de inwerkende noxe.

III

Het periostale deel van de dura mater heeft geen recht op de benaming „hersenvlies”.

IV

Een postmortaal onderzoek is onvolledig, wanneer daarbij het centrale zenuwstelsel en de omhulsels daarvan buiten beschouwing worden gelaten.

V

Diabetes insipidus kan met carbamazepine worden behandeld.

VI

Het is gewenst een onderzoek in te stellen naar het effect van hoge doses corticosteroiden op de functies van het hypothalamisch-hypofysaire systeem in geval van ernstige biologische ontregelingstoestanden zoals de contusio cerebri, de shock en de vetembolie.

VII

Met het oog op een in te stellen behandeling met corticosteroiden of ACTH is het goed te weten, dat de zogenaamde pernicieuze psychose zich ook in „kleine” onrust kan manifesteren.

VIII

Simplistische theorieën en sommige psychopharmaca hebben met elkaar gemeen, dat zij beide geestelijke rust verschaffen.

IX

Wanneer bepaalde ontwikkelingen in het gebruik van de Nederlandse taal voortgang vinden, is te verwachten, dat in de toekomst kennis en ervaring worden aangeduid met „no-hau”.

X

Wellicht verlangt de hoffelijkheid, dat de promoverende in het begin van de promotie-plechtigheid niet alleen een buiging maakt voor hoogleraren en lectoren, maar ook voor de toehoorders, die zo welwillend zijn van hun belangstelling blijk te geven; zij/hij zou dit kunnen doen alvorens de haar/hem toegewezen plaats in te nemen.

Stellingen behorende bij het proefschrift van P. S. Eringa, Groningen, november 1978.